

PASIËNTINLIGTINGSBLAD (PIL)

SKEDULERINGSSTATUS: S4

RIAMILOVIR 250 PHARMACENTRIX kapsules

Riamilovirnatriumdihidraat

Suikervry

Lees hierdie volledige pamflet noukeurig deur voordat u hierdie medisyne begin gebruik.

- Bewaar hierdie pamflet. U mag dit weer nodig hê.
- Indien u verdere vrae het, raadpleeg u dokter, apteker of verpleegkundige.
- Hierdie medisyne is slegs vir u voorgeskryf. Moet dit nie met ander deel nie, selfs al het hulle soortgelyke simptome.

INHOUD VAN HIERDIE PAMFLET

- Wat RIAMILOVIR 250 PHARMACENTRIX is en waarvoor dit gebruik word
- Wat u moet weet voordat u dit gebruik
- Hoe om dit te gebruik
- Moontlike nuwe-effekte
- Hoe om dit te bêre
- Inhoud van die verpakking en ander inligting

1. WAT RIAMILOVIR 250 PHARMACENTRIX IS EN WAARVOOR DIT GEBRUIK WORD

RIAMILOVIR 250 PHARMACENTRIX is 'n antivirale middel.

Dit word gebruik vir die behandeling van griep (influenza) by volwassenes.

2. WAT U MOET WEET VOORDAT U RIAMILOVIR 250 PHARMACENTRIX GEBRUIK

Moet NIE RIAMILOVIR 250 PHARMACENTRIX gebruik nie:

- Indien u allergies (hipersensitief) is vir riamilovirnatriumdihidraat of enige van die ander bestanddele van hierdie medisyne.

Waarskuwings en voorsorgmaatreëls

Raadpleeg u dokter of apteker voordat u hierdie medisyne gebruik indien u:

- nier- of lewerprobleme het;
- 'n bejaarde pasiënt is.

Hierdie medisyne word nie aanbeveel vir kinders jonger as 18 jaar nie.

Ander medisyne en RIAMILOVIR 250 PHARMACENTRIX

Vertel altyd u dokter of apteker indien u enige ander medisyne gebruik, onlangs gebruik het of moontlik gaan gebruik (insluitend tradisionele of aanvullende medisyne).

- Indien saam met ribavirien gebruik word, moet die dosis van ribavirien verminder word.
- Gelyktydige gebruik met purien-analoe (bv. azatioprien, merkaptopurien, tioguanien) en pirimidienbassis (bv. 5-fluorourasiel, sitarabien, gemesitabien) kan lei tot verhoogde toksisiteit.

Swangerskap en borsvoeding

Indien u swanger is of borsvoed, vermoed dat u swanger is of beplan om swanger te raak, raadpleeg u dokter of apteker voordat u hierdie medisyne gebruik.

Moet NIE hierdie medisyne gebruik tydens swangerskap of borsvoeding nie.

Bestuur en gebruik van masjinerie

Dit is nie altyd moontlik om te voorspel in watter mate hierdie medisyne u daaglikse aktiwiteite kan beïnvloed nie.

Maak seker dat u bewus is van die effek daarvan voordat u bestuur of masjinerie gebruik.

Hierdie medisyne sal waarskynlik nie u vermoë om te bestuur of masjinerie te gebruik benadeel nie.

3. HOE OM RIAMILOVIR 250 PHARMACENTRIX TE GEBRUIK

Gebruik altyd hierdie medisyne presies soos deur u dokter of apteker voorgeskryf.

Raadpleeg hulle indien u onseker is.

Moet nie hierdie medisyne met ander deel nie.

Aanbevole dosis:

- Behandeling moet nie later as die tweede dag na die aanvang van simptome begin word nie.
- 1 kapsule (250 mg) drie keer per dag
- Maksimum daaglikse dosis: 750 mg

- Vir 5 opeenvolgende dae

Toedieningswyse:

- Vir orale gebruik
- Neem met of sonder kos met voldoende water
- Slik die kapsule heel in; moenie kou of fynmaak nie

Indien u meer geneem het as wat u moes

In geval van oordosering, sal behandeling simptome en ondersteunend wees.

Simptome kan insluit:

- naarheid
- braking
- dispepsie
- abdominale pyn

Raadpleeg onmiddellik u dokter of apteker. Indien nie beskikbaar nie, kontak die naaste hospitaal of gifbeheersentrum.

Indien u 'n dosis vergeet

Neem die gemiste dosis so gou moontlik, tensy dit beteken dat u 'n dubbele dosis sal neem.

Moet NIE 'n dubbele dosis neem om 'n gemiste dosis in te haal nie.

4. MOONTLIKE NEWE-EFFEKTE

Soos alle medisyne kan hierdie medisyne newe-effekte veroorsaak, hoewel nie almal dit ervaar nie.

Staak gebruik en verkry onmiddellik mediese hulp indien u:

- swelling van die gesig, lippe, ooglede of mond ervaar;
- probleme met sluk of asemhaling ontwikkel;
- uitslag met jeuk ontwikkel.

Hierdie is ernstige newe-effekte en vereis dringende mediese aandag.

Baie skaars:

- Verhoogde eosinofiele

- Allergiese reaksies
- Gastro-intestinale simptome (winderigheid, diarree, naarheid, braking)
- Abdominale pyn
- Veranderings in urienanalise
- Verhoogde lewerensieme (ALT, AST) en bilirubien

Frekwensie onbekend:

- Helmintinfeksies
- Respiratoriese sinsitiaalvirusinfeksie
- Hoofpyn
- Katarale simptome
- Velirritasie
- Angio-edeem

Indien u algemene toestand versleg of u enige ongewenste effekte ervaar, raadpleeg u dokter of apteker.

Aanmelding van nowe-effekte

Indien u nowe-effekte ervaar, praat met u dokter, apteker of verpleegkundige.

U kan ook nowe-effekte aan SAHPRA rapporteer via:

- Med Safety App (Medsafety X SAHPRA)
- eReporting platform (who-umc.org)

5. HOE OM TE BÊRE

- Berg by of onder 25 °C
- Berg in 'n droë, donker plek
- Hou buite bereik en sig van kinders

Moet NIE hierdie medisyne gebruik na die vervaldatum wat op die verpakking aangedui is nie.

Moet NIE ongebruikte medisyne in riole of toilette weggooi nie.

6. INHOUD VAN DIE VERPAKKING EN ANDER INLIGTING

Wat bevat hierdie medisyne:

- Aktiewe bestanddeel: riamilovirnatriumdihidraat (250 mg per kapsule)
- Ander bestanddele: kalsiumstearaat, gelatienkapsule en kleurstowwe

Voorkoms en verpakking:

- Harde gelatienkapsules (grootte 1) met 'n geel liggaam en rooi dop
- Inhoud: geel tot geelgroen kristallyne poeier of granules

Verpakking:

- 10 kapsules per blister
- Pakkies van 20 of 50 kapsules

Registrasiehouer

Pharmacentrix (Edms) Bpk
6 Ateljee Straat
Randpark Ridge
Randburg
Suid-Afrika

Laas hersien:

21 Januarie 2025

Registrasienommer:

550440